

## Vacunas escolares requeridas y recomendadas en Indiana 2023-2024

Grado	Vacunas obligatorias		Vacunas recomendadas
<b>Preescolar</b>	3 Hepatitis B 4 DTaP (Difteria, Tétanos y tos ferina) 3 Polio	1 Varicela 1 MMR (Sarampión, paperas y Rubéola) 2 Hepatitis A	Influenza anual COVID-19
<b>De preescolar al quinto grado</b>	3 Hepatitis B 5 DTaP (Difteria, Tétanos y tos ferina) 4 Polio	2 Varicela 2 MMR (Sarampión, paperas y Rubéola) 2 Hepatitis A	Influenza anual COVID-19
<b>De sexto al onceavo grado</b>	3 Hepatitis B 5 DTaP (Difteria, Tétanos y tos ferina) 4 Polio 2 Varicela	2 MMR (Sarampión, paperas y Rubéola) 2 Hepatitis A 1 MCV4 (Meningocócica) 1 Tdap (Tétanos, difteria y Tos ferina)	Influenza anual 2/3 VPH ( Virus del papilloma humano) COVID-19
<b>Doceavo grado</b>	3 Hepatitis B 5 DTaP (Difteria, Tétanos y tos ferina) 4 Polio 2 Varicella	2 MMR (Sarampión, paperas y Rubéola) 2 Hepatitis A 2 MCV4 (Meningocócica) 1 Tdap (Tétanos, difteria y Tos ferina)	Influenza anual 2/3 VPH ( Virus del papilloma humano) 2 MenB (Meningocócica) COVID-19

**Hepatitis B:** La edad mínima para la tercera dosis de hepatitis B es de 24 semanas de edad.

**DTaP:** se aceptan 4 dosis de DTaP, DTP y DT si la cuarta dosis se administró al cumplir 4 años o después de haberlo cumplido.

**Polio\*:** Se aceptan 3 dosis de Polio si la tercera dosis se administró al cumplir 4 años o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior.  
\*Para los estudiantes de kínder al doceavo grado, la dosis final debe administrarse al cumplir 4 años o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

**Varicela:** La documentación médica sobre el historial de la enfermedad, incluido el mes y el año, es una prueba de inmunidad para los niños desde el preescolar hasta el doceavo grado. El informe de los padres sobre el historial de la enfermedad no es aceptable.

**Tdap:** No hay un intervalo mínimo desde la última dosis de Td.

**MCV4:** Las personas que reciben la prima dosis al cumplir 16 años o después solo necesitan 1 dosis de MCV4.

**Hepatitis A:** El intervalo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses naturales. Se requieren 2 dosis para todos los niños desde el preescolar al doceavo grado.

Departamento de Salud de Indiana  
División de Inmunización  
(800) 701-0704